

## **Sollievo dal dolore durante il parto Analgesia controllata dal paziente (PCA) con oppioidi a breve durata d'azione (Remifentanyl)**

Il medicinale può essere somministrato via fleboclisi mediante una pompa d'infusione. Avrà a disposizione un pulsante al quale è collegata la pompa. In questo modo potrà controllare autonomamente la somministrazione dell'analgésico. Il medicinale utilizzato è il **Remifentanil** (Ultiva®) un preparato a base di morfina con bassissima durata d'azione (azione di pochi minuti), utilizzato di frequente in anestesia. Viene utilizzato da alcuni anni in ostetricia. Tuttavia non è stata richiesta alcuna autorizzazione ufficiale ("off label use"), il che vale anche per alcuni altri medicinali utilizzati in ostetricia.

Le mettiamo a disposizione questo metodo per via delle esperienze estremamente positive in numerose cliniche svizzere e internazionali. Il medicinale viene eliminato nel giro di pochi minuti dalla Sua circolazione sanguigna e da quella del bambino e perde così la sua azione. Come per tutti gli oppiacei, gli effetti collaterali più comuni comprendono nausea/vomito e sonnolenza. Raramente si verifica un rallentamento dell'attività respiratoria.

Tali effetti collaterali, in confronto ad analgesici di vecchia generazione come Pethidin® o Tramal® sono di durata molto inferiore (da secondi a minuti) e cessano all'interruzione della somministrazione del medicinale.

Siamo a Sua completa disposizione per chiarire qualunque Sua domanda.

### **Le Sue domande:**

.....  
.....

Per motivi legali Lei ha l'obbligo, **prima** che si presentino le doglie forti, di certificare con una firma di aver ricevuto sufficienti informazioni sui metodi proposti e di non avere ulteriori domande. Nessuno dei metodi citati verrà eseguito senza il Suo consenso a voce. Invi questo modulo unitamente al questionario alla nostra clinica oppure porti con sé il foglio all'ingresso in clinica.

### Dichiarazione di consenso della paziente

Ho letto e compreso interamente il presente foglio informativo. Ho avuto tempo sufficiente per riflettere e per avere chiarimenti sulle domande. Nel caso dovesse essere necessario o richiesto durante il parto utilizzare i metodi sopraccitati, ne do il consenso. Sono inoltre d'accordo alla registrazione anonima dei dati di monitoraggio per il PCA Remifentanil nel registro dati per controllare e migliorare continuamente il metodo.

Data paziente/partoriente

Ostetrica/ostetrico

.....